



DOCUMENT DE SYNTHÈSE DE L'ÉVALUATION DES PRATIQUES ET DES ACTIONS D'AMÉLIORATION

ACTION DPC : « La boucle fermée dans le traitement du diabète de type 1 » - Action N° 45432325001 - session 1 – Formation présentielle du 21/03/2023 – Lieu de la formation : Montpellier

Ces actions d'amélioration des pratiques ont été retenues après le suivi de la formation cognitive virtuelle et à partir des échanges avec les orateurs et les organisateurs de la formation durant la phase virtuelle et la phase post-formation virtuelle ainsi que sur la base du contenu de la formation.

- A. Nous, vous proposons 2 documents **d'aide à la pratique** que vous pourrez intégrer aux documents personnalisés de votre logiciel médical :
- Liste des éléments pour vérifier l'éligibilité à la mise en route d'une insulinothérapie par boucle fermée :**
 - Diabète de type 1
 - Rénine active (valeurs en mUI/l ou en pg/ml).
 - HbA1c > 8% ou Hypoglycémies sévères si système DBL IQ, DIABELOO ou PCAMAPS.
 - Liste des éléments préparatoires à organiser avant la mise en route d'une insulinothérapie par boucle fermée :**
 - Type de smartphone
 - Date de formation au comptage des glucides
 - Date de formation à l'insulinothérapie fonctionnelle
 - Date de la demande d'entente préalable (minimum 14j avant la mise en place du matériel)
 - Date de la mise en place du capteur et/ou pompe nécessaire
- B. Nous vous proposons de réaliser **2 actions d'évaluation des pratiques** sur les 10 prochain(e)s patient(e)s concerné(e)s par un diabète de type 1 traité par pompe à insuline et pour lequel(els) une insulinothérapie par boucle fermée est envisagée, à partir des propositions ci-dessous. Il s'agit d'une **auto-évaluation** visant à mettre en pratique **les actions retenues d'amélioration de la pratique à l'issue des 3 temps de la formation DPC intégrée** (test préformation présentielle, formation présentielle et test post-formation présentielle).
1. Evaluer l'éligibilité des patient(e)s diabétiques de type 1 traité(e)s par pompe à insuline
 2. Evaluer les dossiers pour lesquels une télésurveillance pourrait être proposée.
 3. Effectuer la comparaison de l'évolution du Temps passé dans la cible (TIR) à 6 mois et à 12 mois de la mise en place de l'insulinothérapie par boucle fermée.